


# Anwendung EpiPen® / EpiPen® Jr.



1. Nehmen Sie den EpiPen® in Ihre dominante Hand und bilden Sie eine Faust um den EpiPen®.
2. Danach die blaue Sicherheitskappe abziehen.
3. Stoßen Sie das orange Ende des EpiPen® aus etwa 10 cm Abstand im rechten Winkel (90°) kräftig in die Außenseite des Oberschenkels und halten Sie ihn dort für 10 Sekunden fest dagegen gepresst.



4. Entfernen Sie den EpiPen®. Der orange Nadelschutz verdeckt nun die Nadel.
5. Wählen Sie den Notruf 144 oder 112, verlangen Sie einen Notarzt und nennen Sie als Grund eine Anaphylaxie.

EPI\_2017\_4

## ANAPHYLAXIE - PASS

Name:

Ich bin Allergiker und reagiere mit einem lebensbedrohlichem anaphylaktischen Schock auf:

# Certificate for Airline Passenger

(for attention of airport security and control)

## Statement for rescue medication

**EpiPen®/EpiPen® Junior** is used for the emergency treatment of sudden and life-threatening allergic reactions (anaphylactic shock) to insect stings and bites, foods, drugs, latex and exercise. EpiPen® contains a sterile solution of adrenaline (epinephrine) for emergency intramuscular self-injection.

The patient (name)

is suffering from a life threatening allergy.

The EpiPen® / EpiPen® junior (adrenaline) auto-injector is the prescribed rescue medication that the patient has to carry at all times. In case of an emergency (a life threatening anaphylactic shock or a serious allergic reaction) the adrenaline can be administered and further damage caused to the patient's health can be avoided.

Physician stamp -  
signature - date

Ich trage meinen EpiPen Adrenalin Autoinjektor mit.  
Sie finden ihn in

Wenn ich nicht in der Lage bin, mir selbst zu helfen, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Autoinjektor.

Rufen Sie anschließend die **Notrufnummern 144** od **112**

Zu benachrichtigende Personen: